

医師による登園許可書の必要なもの

感染症名	感染しやすい時期	登園のめやす
麻疹（はしか）	発症1日前から発疹出現後の4日後まで	解熱後3日を経過してから
インフルエンザ	症状がある期間（発症前24時間から発病後3日程度までが最も感染力が強い）	発症したのち5日を経過し、解熱した後2日（幼児は3日）
風疹	発疹出現の前7日からあと7日間くらい	発疹が消失してから
水痘（水ぼうそう）	発疹出現1～2日前から痂皮形成まで	すべての発疹が痂皮化してから
流行性耳鼻下腺炎 （おたふくかぜ）	発症3日前から耳下腺腫脹後4日	耳下腺、顎下腺、した下腺の腫脹発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
結核		医師による感染の恐れがないと認めるまで
咽頭結膜炎（プール熱）	発熱、充血など症状が出現した数日間	主な症状が消え2日経過してから
流行性角膜炎	充血、目やに等症状が出現した数日間	感染力が非常に強い為、結膜炎の症状が消失してから
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで	特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療を終了するまで
腸管出血性大腸菌感染症 O157、O26、O111など		症状が治まり、かつ抗菌薬による治療が終了し、48時間を空けて連続2回目の検便によって、いずれも菌陰性が確認されてから
急性出血性結膜炎	ウイルスが呼吸器から1～2週間、便から数週間～数か月排出される	医師により感染の恐れがないと認められるまで
髄膜炎菌性髄膜炎		医師により感染の恐れがないと認められるまで