

医師の診断を受け保護者が届出をだすもの

病名	感染しやすい時期	登園のめやす
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日	抗菌薬内服後24～48時間経過していること
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間	発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病	手足や口腔内に水泡・腫瘍が発症した数日間	発熱がなく（解熱後1日以上経過し）普段の食事ができること
伝染性紅班 （リンゴ病）	発疹出現前の1週間	全身状態ができることら
ウイルス性胃腸炎（ノロ、ロタ、アデノウイルス等）	症状がある間と症状消失後1週間 （量は減少していくが数週間ウイルスを輩出している ので注意が必要）	嘔吐・下痢等の症状が治まり、普段の食事ができること
ヘルパンギーナ	急性期の数日間（便の中に1か月程度ウイルスを排泄している ので注意が必要）	発熱がなく（解熱後1日以上経過し）普段の食事ができること
RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身症状がよいこと
帯状疱疹	水泡を形成している間	すべての発疹が痂皮化してから
突発性発疹		解熱し機嫌がよく全身症状がよいこと